

Guía para pacientes sobre Cirugía Ortognatica

Que es la cirugía ortognatica?

La cirugía ortognatica es una operación para posicionar en el lugar correcto los maxilares. (Ortho = recto, gnathia= maxilar). El objetivo de esta intervención es lograr un correcto balance entre el maxilar superior e inferior que permite que los dientes ocluyan correctamente; esto trae además una mejora estética por un balance proporcionado facial.

Por qué es necesaria la cirugía?

Solo se realiza cirugía de los maxilares si está indicado o si el paciente desea realizársela. Hay veces en las cuales no es posible corregir un problema de mala mordida usando solamente ortodoncia. Esto es porque los huesos de la cara en donde asientan los dientes pueden estar mal posicionados o pueden haber crecido incorrectamente y desproporcionadamente entre ellos (ej. Usted puede tener una mandíbula más alargada y un maxilar de un tamaño normal o acompañado de un maxilar en posición retruída). La cirugía ortognatica permite corregir estas discrepancias y lograr una correcta forma facial

Por qué necesito además de la cirugía un tratamiento de ortodoncia?

Es importante usar ortodoncia para mover los dientes y asegurarnos que durante la cirugía se va a lograr una correcta mordida. Generalmente son fijados pines a los brackets unos meses antes de la cirugía. Luego de la cirugía la ortodoncia es mantenida unos 6 meses más para lograr un correcto ajuste y estabilidad oclusal.

Cuanto demora el tratamiento?

En total, el tratamiento puede tardar 1 año y medio a dos años. Con la cirugía al año de haber comenzado la ortodoncia.

Tenga en cuenta que el tratamiento se retrasará si usted falta a consultas sobre todo en la etapa ortodónica.

Es una operación dolorosa?

Luego de la cirugía, es más considerable la inflamación que el dolor, ya que este último es calmado mediante analgesia intra y post quirúrgica. Todos los pacientes son diferentes, pero generalmente la inflamación empeora las primeras 36-48 horas y luego va decreciendo gradualmente.

Usted verá en los siguientes meses como va mejorando su apariencia final.

Por cuánto tiempo estaré en el hospital?

Esto depende de cada paciente, la mayoría permanece una o dos noches luego de la cirugía. Posteriormente usted debe considerar tomarse entre dos a cuatro semanas de reposo.

Que involucra la cirugía?

Esta operación es realizada completamente por dentro de la boca, por lo tanto no quedan cicatrices visibles. Los maxilares son reposicionados y fijados en su nuevo lugar por pequeñas placas de titanio y tornillos, que permanecen debajo de las encías.

Los dientes no son fijados entre ellos con alambre, pero luego son colocados pequeños elásticos para guiar la mordida.

Puedo comer luego de la cirugía?

La boca se mantiene abierta desde el primer día, pero estará limitada por la inflamación. Es necesario comenzar con dieta y alimentos desde el primer día y progresivamente aumentar su consistencia desde dieta líquida, blanda hasta una dieta normal en pocas semanas.

Cuáles son los riesgos o complicaciones asociados a este procedimiento?

Es generalmente un procedimiento muy seguro que es realizado con frecuencia por especialistas. Complicaciones son raras.

- **Adormecimiento del labio:** inmediatamente después de la operación, similar a la sensación de anestesia aplicada por el odontólogo. Se resuelve por sí misma en un par de meses (6-9 meses)
- **Infección:** Las pequeñas placas de titanio son dejadas permanentemente. En pocos casos (menos del 5%) deben ser removidas si se infectan, pero estas ya han cumplido con su cometido por lo tanto no generan ningún problema.
- **Recidiva:** En la mayoría de los pacientes es muy infrecuente un relapso, sin embargo aquellos pacientes con grandes y complicadas cirugías o en pacientes con síndromes craneofaciales, esto puede llegar a ocurrir. Si ocurre, es necesario recurrir nuevamente a cirugía para corregir este problema si es de importancia la recidiva, de lo contrario se mantiene bajo control.

Voy a lucir diferente luego de la cirugía?

Ciertamente usted va a lucir bastante diferente en varios aspectos; cuan diferente depende de su problema original y lo mucho que los maxilares van a ser movidos. La cirugía ortognática apunta a lograr un correcto balance del contorno facial, produciendo una apariencia altamente satisfactoria y con una mordida apropiada. La gran mayoría de los pacientes quedan muy satisfechos con los resultados.


Hay otra alternativa a la cirugía?

SI, no realizársela. Nadie lo va a obligar a realizarse una cirugía, pero al momento, esta es la mejor forma de corregir este problema.

Tipos de Deformidades

Hipoplasia de mentón

Pre-Op Post-Op




Hiperplasia de mentón



Síndrome de la cara larga (cirugía bimaxilar)



Retrognatismo mandibular




Retrusión maxilar




Mordida abierta



Prognatismo mandibular con hipoplasia maxilar (cirugía bimaxilar)



Sonrisa Gingival



Dr. Molina Santiago

Cirugía bucal y maxilofacial

Cirugía Ortognatica

Clínica Andina

Aberastain 153 norte.

CP: 5400.

San Juan. Argentina

Tel: +54 (0264) 4213475

www.dr santiagomolina.com.ar

drsantiagomolina@gmail.com

Mapa de Ubicación

